

Original Article

Effect of hydro alcoholic extract of pumpkins seed on the renal and hepatic serum variables and histological changes in adult female rats

Samaneh Motamed Jahromi 

School of Medical Science, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran, Educational Development Center, Bandarabas University of Medical Sciences, Bandarabas, Iran

*Corresponding author; E-mail: Sanammorsal400500@yahoo.com

Received: 26 February 2017 Accepted: 21 May 2017 First Published online: 5 March 2019
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2019 April-May; 41(1):82-91

Abstract

Background: The nature is a rich source of medicinal compounds in plants. Some of them are hidden in plants. Pumpkin seeds have long been used in Traditional medicine of many countries. Due to the unavailability of sufficient scientific evidence on the effects of this substance on the liver and kidneys, this study was designed.

Methods: In this experimental study, 40 rats immature Wistar (in the range of weight 10 ± 180 g and the age of 60 days) and divided into 5 groups of 8 animals: three experimental groups, control and sham groups. Extract the experimental groups (20, 50, 100 mg dose of pumpkin seed extract kg) was injected intraperitoneally for 21 consecutive days. One day after the last injection blood samples from rats to evaluate serum levels of ALT, AST, ALP, total protein, albumin, bilirubin, uric acid, creatinine and liver and kidney were removed for histological studies.

Results: No significant changes in serum levels of ALT, AST, total protein, albumin, bilirubin, uric acid, creatinine compared was found in experimental group. The serum ALP 3 in the experimental group had a significant decrease. Totally, no changes were observed in liver tissue but the diameter of the Boman's capsule and the glomerulus and kidney cortex in the experimental group had a significant decrease.

Conclusion: Extract of pumpkin seeds has been able to significantly reduce the serum ALP and as well as on kidney tissue to reduce the diameter of glomeruli and Bowman's capsule and the cortex.

Keyword: Kidney- Liver- Mature -Pumpkin Seeds- Rats.

How to cite this article: Motamed Jahromi S. [Effect of hydro alcoholic extract of pumpkins seed on the renal and hepatic serum variables and histological changes in adult female rats.]. Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2019 April-May;41(1):82-91. Persian.

مقاله پژوهشی

اثر عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو تنبیل بر میزان متغیرهای کلیوی و کبدی و تغییرات بافتی این دو ارگان در موشهای صحرایی ماده بالغ

سامانه معتمد جهرمی*

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، بندرعباس، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: Sanammorsal400500@yahoo.com

دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۸ پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۳۱ انتشار برخط: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ۱(۴۱): ۸۲-۹۱

چکیده

زمینه: طبیعت، منبعی غنی از ترکیبات دارویی می باشد که بخشی از آنها در گیاهان نهفته‌اند. تخمه کدو تنبیل به مدت طولانی در طب سنتی بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن شواهد علمی کافی درخصوص میزان تأثیر این ماده بر کبد و کلیه این تحقیق طراحی و اجرا گردید.

روش کار: در این تحقیق تجربی ۴۰ سرمش موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستان (در محدوده وزنی 180 ± 10 گرم و سن 60 روز) انتخاب و به طور تصادفی به ۵ گروه ۸ تابی: سه گروه تجربی، کترل و شم تقسیم شدند. به گروه‌های تجربی عصاره (با دوزهای ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبیل) به مدت ۲۱ روز متوالی به صورت درون صفاقی تزریق شد. یک روز بعد از آخرین تزریق خوننگیری از موشهای جهت بررسی سطح سرمی ALT، AST، ALP پروتئین تام، آلبومین، بیلی رویین، اسید اوریک، کراتینین به عمل آمد و کلیه و کبد آنها نیز برای مطالعات بافت شناسی برداشته شد.

یافه ها: در بررسی های انجام شده، تغییر معنی داری در سطح سرمی ALT، پروتئین تام، آلبومین، بیلی رویین، اسید اوریک، کراتینین نسبت به گروه کترل مشاهده نگردید. میزان سرمی ALP در گروه تجربی ۳ نسبت به گروه کترل کاهش معنی دار را نشان داد. از نظر مطالعات بافتی تغییری در بافت کبد مشاهده نشد ولی قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری کلیه در گروه تجربی ۲ و ۳ نسبت به گروه کترل کاهش معنی داری را نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری: عصاره تخمه کدو تنبیل توانسته است میزان سرمی ALP را به طور معنی دار کاهش دهد و همچنین بر روی بافت کلیه گروه تجربی ۲ و ۳ باعث کاهش قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری شده است.

کلید واژه ها: بالغ، تخمه کدو، کلیه، کبد، موش صحرایی

نحوه استناد به این مقاله: معتمد جهرمی س. اثر عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو تنبیل بر میزان متغیرهای کلیوی و کبدی و تغییرات بافتی این دو ارگان در موشهای صحرایی ماده بالغ. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز. ۱۳۹۸؛ ۱(۴۱): ۸۲-۹۱.

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز تحت مجوز کریپتو کامنز (Creative Commons) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

مقدمه

از جمله خواص کدو، ادرار آور و برطرف کنندهٔ یرقان می‌باشد. کدو حلواهی سینه را نرم می‌کند و تب بر می‌باشد. برای درمان کم خواهی مفید است و بافت‌های بدن را مستحکم می‌کند و قوای جسمی و روحی را افزایش می‌دهد. طبیعتی سرد دارد و تسکین دهندهٔ صفر است. آب کدوی خام سرشار از ویتامین‌های B1، B2، B3، B6 و نیاسین و همچنین دارای مواد معدنی قلیایی، کلسیم و پتاسیم است. ضماد کوبیده کدو برای سردد و درد شقیقه بسیار سودمند است. خوردن روغن کدو برای معالجهٔ افسردگی و تشنج بسیار مفید است (۱۰). کدو دارای مقدار زیادی ماده ضد سرطان و آنتی اکسیدان به نام کاروتونوئید می‌باشد. پوست کدو در درمان بواسیر، خون‌ریزی معده و روده مفید است (۱۱).

با توجه به تمام موارد فوق تاکنون و کمبود منابع (فقدان یا کمبود تحقیقات انجام شده) اثر مصرف بالای کدو بر پارامترهای بدن مورد مطالعه قرار نگرفته است، لذا هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو در دوزهای بالا بر بافت کلیه و کبد و آنزیم‌های کبدی و کلیوی است.

روش کار

این مطالعه از نوع علم پایه می‌باشد که به صورت یک مطالعه تجربی و کاربردی با جامعهٔ پژوهش موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار انجام گردید. در این مطالعه جهت رسیدن به نتایج به بررسی سطح سرمی ALT، AST، ALP، پروتئین تام، آلبومین، بیلی رویین، اسید اوریک، کراتینین پرداخته و کلیه و کبد آنها نیز برای مطالعات بافت شناسی برداشته شد. رعایت ملاحظات اخلاقی از قبیل مطالعه بر روی نمونه حیوانی به جای نمونه انسانی، مراقبت و رعایت نظافت موشها در طول دو هر مطالعه و بیهوشی سریع و مرگ بدون درد موشهای صحرایی انجام گردید.

در این تحقیق حجم نمونه به روش نمونه گیری آسان انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی موش‌های نمونه بین گروه‌ها تقسیم شدند. حیوانات به صورت تجربی و به تعداد ۴۰ سرموش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار در محدودهٔ وزنی 180 ± 10 گرم و سن ۶۰ روز به صورت جداگانه و به طور تصادفی به ۵ گروه ۸ تایی شامل گروه‌های تجربی ۱، ۲ و ۳، کنترل و شم تقسیم شدند.

موشهای صحرایی از مرکز پژوهش خانه حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم تهیه شد و در همین مرکز کارهای عملی انجام گرفت. غذای مصرفی آن‌ها به صورت آماده تهیه شد که به آن‌ها Pellet می‌گویند. از آب لوله کشی شده جهت تأمین آب مصرفی حیوانات استفاده شد. درجه حرارت محیط نگهداری

طبیعت، منبعی غنی از ترکیبات دارویی است که بخشی از آنها در گیاهان نهفته‌اند. به طوری که از هزاران سال پیش این گیاهان کاربرد زیادی به عنوان داروهای سنتی داشته‌اند. اخیراً در کشورهای در حال توسعه به دلیل اثرهای جانبی داروهای سنتزی، استفاده از داروهای گیاهی در درمان انواع بیماریها و استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی در کارخانه‌های مواد غذایی مورد توجه زیادی قرار گرفته است و تحقیقات در زمینهٔ استخراج ترکیب‌های فعال بیولوژیکی از گیاهان به سرعت در حال انجام می‌باشد (۱).

تخمه کدو تبلی حاوی ۹۴ گرم آب، ۱/۱ گرم پروتئین، ۰/۱ گرم چربی، ۶۳ گرم نشاسته، ۲۸ میلی گرم کلسیم، ۳۰ میلی گرم فسفر، ۰/۴ میلی گرم آهن، ۲/۲ میلی گرم پتاسیم، ۴۰۰ میلی گرم ویتامین A، ۰/۰۵ میلی گرم ویتامین B1، ۰/۰۹ میلی گرم ویتامین B2، ۱ میلی گرم ویتامین B3، ۲۲ میلی گرم ویتامین C و همچنین یک منع خوب روی و اسیدهای چرب غیر اشباع و فیتواستریول‌ها (β-sitosterol) است. اسیدهای چرب در دانه کدو تبلی شامل اسید پالمتیک، اسید استریک، اسید اولئیک و اسید لینولئیک می‌باشد و همچنین دارای پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، آنتی اکسیدان، کاروتونوئیدها و توکوفرول غنی می‌باشد. مشخص شده که این ترکیبات بر بافت‌های بدن اثرات مثبت دارند (۲، ۳).

کدو تبلی به مدت طولانی در طب سنتی بسیاری از کشورها، از جمله چین، آرژانتین، هند، مکزیک، بربازیل و کره استفاده می‌شود (۴). کدو تبلی و دانه‌ی آن، یک غذای معروف بومی سرخچپستان آمریکایی است و دارای خواص درمانی و تغذیه‌ای منحصر به فرد است. دانه کدو تبلی در برخی از غذاهای اروپایی، به طور عمده در بخش‌های جنوبی، اتریش، مجارستان و اسلوونی استفاده می‌شود. امروزه تولید کنندگان تجاری کدو تبلی، ایالات متحده، مکزیک، هند و چین می‌باشند (۵).

مطالعه Salimi و همکاران نشان داد که بعلت اثرهای جانبی داروهای شیمیایی، حساسیت افراد زیادی به برخی از این داروهای مقاوم شدن بسیاری از بیماریها در برابر داروهای شیمیایی نظر محققان به استفاده از فرآورده‌های گیاهی در زمینه‌های مختلف معطوف شده است (۶). گیاهان دارویی به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که دارای ماده مؤثره است و در درمان اکثر بیماری‌ها پیشگیری از بروز آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷). دانشمندان در بسیاری از کشورها با شتابی وصف ناپذیر برای شناسایی گیاهان دارویی، خواص و ترکیبات آنها در تلاشند. کشور ما ایران به دلیل تنوع آب و هوایی، مکان مناسبی برای رویش گیاهان دارویی است (۸). همچنین در طب سنتی به عنوان دانشی که از میراث گذشتگان به ما رسیده و می‌تنی بر طبیعت است، گیاهان دارویی جایگاه ویژه‌ای دارند (۷).

مراحل انجام شده ۱۶ گرم عصاره خشک به دست آمد و بقیه تفاله بوده است، پس عصاره حاصل به دست آمده ۱۶ درصد است. در نهایت دوز کشنده دارو تعیین گردید و سپس دوزهای حداقل و متوسط وحداکثر تزریق شد (۱۲).

بررسی میکروسکوپی بافت کلیه و کبد:

پس از خوننگیری ناحیه شکمی برش زده شد و کبد و کلیه توسط اسکالپل و پنس از بافت های چربی اطراف جدا گردید. کبد و کلیه تمامی حیوانات جدا و با سرم فیزیولوژی شستشو داده شدند، سپس هر کدام از آنها وارد یک شیشه حاوی فرمالین ۱۰٪ کرده و برای مدت ۱۴ روز در محلول فرمالین نگهداری شدند. سپس کبد و کلیه ها به صورت جداگانه به آزمایشگاه بافت شناسی ییمارستان شهید مطهری جهرم جهت تهیه لام ارسال می گردید.

اسلایدهای تهیه شده از بخش های مختلف بافتی کبد و کلیه به صورت جداگانه امکان مطالعه بافتی را فراهم نمود. در هر اسلامید به ترتیب میزان احتقان و پرخونی عروق، آتزی بافتی، میانگین اندازه لوله های کلیوی و میزان تخریب بافت کبدی (برخی از پارامترهای بافتی کبد شامل از بین رفتن نظم رو به مرکز هپاتوسیت ها، پرخونی، اتساع وریدها، نکروز هپاتوسیت ها، تجمع سلول های کوپفر، ارتشاح سلول های آماسی و تغییرات فضای پورتال) توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی $400\times$ در ۱۰ میدان دید (مجموعاً ۵۰ میدان دید در هر حیوان) مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. سپس میانگین آنها در هر گروه مشخص و با گروه های دیگر مقایسه گردید (۱۲).

تعیین دوز عصاره تخمه کدو تنبیل:

چند غلظت از عصاره کدو تنبیل را به صورت تصادفی انتخاب و به ۵ گروه ۸ تابی از موش ها تزریق کردیم. در هر گروهی که نیمی از موشاها مرده، دوز مصرفی به عنوان LD₅₀ انتخاب شد که برابر با 400mg/kg بود، غلظت های حداقل، متوسط و حداقل تعیین شد. لازم به ذکر می باشد عصاره تخمه کدو تنبیل از مرکز تهیه عصاره داشنگاه پژوهشی شیراز تهیه شد. طبق دستور العمل در هر لیتر از عصاره تهیه شده ۴۰۰ میلی گرم عصاره خالص وجود داشت که با توجه به وزن موش ها که حدود ۲۰۰ گرم بودند در تعیین LD₅₀ هر میلی لیتر از این عصاره به ۵ موش تزریق شد.

برای تهیه دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره اولیه با سرم فیزیولوژی به نسبت دو برابر رقیق شد. حال با توجه به وزن موش ها، موش های بالغ (وزن ۲۰۰ گرم) روزانه 0.2 g سی و موش های نابالغ (وزن ۱۰۰ گرم) روزانه 0.1 g سی از این محلول دریافت کردند (۱۲).

23 ± 2 درجه سانتی گراد و دوره ۱۲ ساعت روشناختی و ساعت تاریکی و رطوبت نسبی $40-60$ در نظر گرفته شد. قفس های نگهداری حیوانات از جنس پلی کربنات به ابعاد $20\times 30\times 50$ سانتی متر با سقف مشبک بود. کف قفس ها از خاک ارده و تراشه چوب پوشیده شده بود. کف اتاق و تجهیزات موجود در آن توسط ساولن ضد عفونی می شدند و همچنین هردو روز یکبار قفس ها خالی و تمیز و ضد عفونی می شدند. در طول دوره تیمار حیوانات دسترسی به آب و غذا داشتند و شرایط نگهداری برای تمام حیوانات یکسان بود. گروه های تجربی به ترتیب 0.1 ml/liter محلول 20 ml و 50 ml و 100 ml گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره تخمه کدو تنبیل و گروه شم 0.1 ml/liter سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی و توسط سرنگ انسولین به مدت ۲۱ روز متوالی هر روز ساعت ۱۰ صبح دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد (۱۲).

در انتهای پژوهش (روز ۲۲) پس از توزین حیوانات به طور مستقیم از قلب حیوانات به کمک سرنگ 5 ml سی (تحت بیهوشی به وسیله دی اتیل اتر) خون گیری انجام شد و سرم آنها توسط دستگاه سانتریفیوژ (به مدت ۱۵ دقیقه و $3000\textrm{-}20$ دور در دقیقه) جمع آوری شدند و در دمای -20°C درجه سیلیسیوس به منظور سنجش ALT AST ALP، پروتئین تام، آبومین، بیلی روبین، اسید اوریک، کراتینین و نیتروژن اوره خون نگهداری گردید.

برای اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمی خون از کیت های اندازه گیری زیست شیمی ساخت ایران و به روش رنگ سنجی و دستگاه اتوآنالایزر مدل Selectera XL ساخت هلنند استفاده شد. تهیه عصاره هیدرو الکلی (80%) تخمه کدو تنبیل به روش زیر انجام شد:

جهت عصاره گیری از روش سوکسله استفاده گردید که 100 g گرم از دانه های کدو تنبیل خشک را به صورت پودر در آورده و 500 ml/liter اتانول 80% ٪ مخلوط کرده و مدت سه روز در هوای آزمایشگاه در دستگاه پرکولاوتور نگهداری شد. بعد از سه روز عصاره را به وسیله شیر پاپین دستگاه قطره قطره جمع آوری گردید. اتانول 80% را به دستگاه اضافه شد تا مادامی که عصاره بدست آمده را بی رنگ نشان دهد و این نشان دهنده آن است که دیگر عصاره ای وجود ندارد و بعد از این مرحله جهت شفاف سازی مخلوط حاصل را از کاغذ صافی عبور دادیم، سپس عصاره بدست آمده را در دستگاه روتاری در درجه حرارت 40°C تبخیر کردیم تا عصاره ای غلیظ به دست آمد. عصاره حاصل با استفاده از دستگاه دسی کاتور تحت خلاء قوی به مدت ۲۴ ساعت قرار دادیم تا رطوبت کامل گرفته شده و خشک شد سپس عصاره خشک به دست آمده را وزن کرده و راندمان آن را به دست آوردیم، که برای 100 g پودر تخمه کدو تنبیل بعد از

به گروه کترل کاهش دهنده و گروه دریافت کننده دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم میزان ALP را نسبت به گروه کترول به طور معنی داری کاهش داد (جدول ۲).

گروه شاهد و گروهها دریافت کننده دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم تغییر معنی داری از نظر غلظت های BUN کراتین، UA، نسبت به گروه کترول نشان ندادند (جدول ۲).

اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو بر میزان متغیر های بافتی کبد و کلیه:

در هیچکدام از گروههای مورد بررسی، عصاره تخمه کدو تبلیغ بر بافت کبد تغییرات معنی داری را از لحاظ پرخونی کبد، ارتضاح سلولهای آماسی، نکروز هپاتوسیتی، واکوئله شدن سلول، روشن شدن سلول پلاسم و تغییرات فضای پورتال اعمال نکرد. قطر بخش قشری کلیه و قطر کپسول بومن و قطر گلومرول در گروههای دریافت کننده دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم نسبت به گروه کترول کاهش معنی داری را نشان می دهد (جدول ۲ و شکل ۱).

گروه شاهد و گروهها دریافت کننده دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم تغییر معنی داری از نظر بخش مرکزی کلیه و قطر لوله دیستال و پروکسیمال و قطر فضای اداری و قطر لوله هنله نسبت به گروه کترول نشان ندادند (جدول ۲).

اثر عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو بر میزان سرمی LH و FSH و استروژن و پروژسترون به علت انتخاب موشهای صحرایی بالغ ماده:

در خلال مطالعه حاضر به علت انتخاب نوع موش ماده مطالعه بر روی هورمونهای جنسی ماده شامل بررسی سطح پارامترهای FSH و LH و استروژن و پروژسترون موجود در خون نیز انجام پذیرفت. روش انجام کار شبیه به همان روش خونگیری و آزمایشگاهی پارامترهای کبدی و کلیوی بود و برای مشخص شدن و هم سیکل کردن موش های صحرایی از تمام آنها اسمیر واژنی تهیه شد تا اطمینان حاصل گردد که همگی در یک فاز از سیکل استروس قرار دارند و همچنین غلظت هورمونهای LH و FSH و استروژن و پروژسترون موجود در سرم خون حیوانات با استفاده از کیت های مخصوص هر کدام (شرکت پیشناز طب) به روش الیزا در آزمایشگاه تشخیص طبی هنری جهرم اندازه گیری شد. نتایج حاصل موردن تجزیه و تحلیل آماری طبق همان روشی که برای تجزیه و تحلیل آماری آنزیم های کبد و کلیه توضیح داده شده است انجام گرفت و در نهایت نتایج گروههای مختلف با گروه شاهد و کترول مقایسه گردید.

برای تهیه دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره با دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن با سرم فیزیولوژی به نسبت دو برابر رقیق شد. حال با توجه به وزن موش ها، موش های بالغ (وزن ۲۰۰ گرم) روزانه ۰/۲ سی و موش های نابالغ (وزن ۱۰۰ گرم) روزانه ۰/۱ سی سی از این محلول دریافت کردند (۱۲).

برای تهیه دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن با سرم فیزیولوژی به نسبت دو برابر رقیق شد. حال با توجه به وزن موش ها، موش های بالغ (وزن ۲۰۰ گرم) روزانه ۰/۲ سی سی و موش های نابالغ (وزن ۱۰۰ گرم) روزانه ۰/۱ سی سی از این محلول دریافت کردند (۱۲).

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شد. محاسبات آماری و ارزیابی نرم افزار SPSS در سطح معنی داری ۵ درصد انجام گردید. معیار ورود، موش های صحرایی ماده بالغ سالم نژاد ویستار و معیار خروج، مرگ حیوان بود.

یافته ها

یافته و نتایج آزمایشگاهی:

اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تبلیغ بر وزن بدن: با توجه به وزن گیری انجام شده در روز اول و روز آخر و مقایسه بین گروههای شاهد و گروههای دریافت کننده دوزهای ۵۰، ۲۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم، بر طبق جدول ۱ چنین می توان نتیجه گرفت که گروه شاهد و گروهها دریافت کننده دوزهای ۵۰ و ۲۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم تغییر معنی داری از نظر وزن بدن نسبت به گروه کترول نشان ندادند (جدول ۱).

اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو بر میزان متغیرهای سرمی کبد و کلیه:

نتایج حاصل با توجه به آزمایشات انجام شده بر میزان متغیرهای سرمی کبد و کلیه و همچنین بافت کلیه و بر طبق جدول ۲ بدین شرح می باشد:

گروه شاهد و گروهها دریافت کننده دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم تغییر معنی داری بر میزان غلظت های AST، آلبومین، Total protein و بیلی رویین نسبت به گروه کترول نشان ندادند (جدول ۲).

گروه شاهد تغییر معنی داری از نظر غلظت ALP نسبت به گروه کترول نشان نداد. گروه دریافت کننده دوز ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر میزان ALP را نسبت به صورت غیر معنی دار میزان

جدول ۱: میزان متغیر وزنی مورد بررسی در گروه های مختلف

تجربی ۳	تجربی ۲	تجربی ۱	شاهد	کنترل	وزن روز اول kg	وزن روز آخر kg
۱۶۷/۲۵±۴/۴۸a	۱۷۰/۱۲±۴/۱۰a	۱۶۳/۳۷±۱/۳۸a	۱۶۳/۳۷±۱/۴۰a	۱۶۴/۳۷±۱/۴۰a		
۱۸۷/۸۷±۲/۶۴a	۱۸۳/۲۵±۳/۸۹a	۱۸۵/۰±۵/۶۴a	۱۹۲/۱۲±۱/۵۰a	۱۹۱/۱۲±۱/۵۸a		


جدول ۲: میزان متغیرهای سرمی کبد و کلیه و بافت کلیه مورد بررسی در گروه های مختلف

• میزان متغیرهای سرمی کبد مورد بررسی در گروه های مختلف


تجربی ۳	تجربی ۲	تجربی ۱	شاهد	کنترل	
۱۶۷±۱۰/۲۲۹a	۱۷۱/۰±۱۴/۹۷a	۱۸۳/۵±۱۷/۳۲۴a	۱۷۵/۵±۱۲/۰۹۶a	۱۷۵/۰±۱۲/۰۹۶a	OT(AST) UL
۵۷/۱۲۵±۲/۶۰۱a	۶۷±۲/۷۱۳a	۷۳±۸/۷۵۹a	۶۰±۳/۵۲۱a	۵۹/۵±۳/۵۲۰a	PT(ALT) UL
۴۵۹/۶۲۵±۴۸/۸۴۳a	۵۳۶/۳۷۵±۵۰/۶۹۳ab	۵۰۱/۷۵±۵۰/۴۴۷ab	۶۷۰/۷۵±۴۲/۱	۶۶۶/۷۵±۴۲/۰۳۱b	ALP (UL)
۷/۱۵۰±۱۳۳a	۷/۷۷۸±۲۲۳a	۷/۵۶۲±۱۳۷a	۷/۵±۱a	۷/۴۶۲±۱۷۴a	(Total protein mg /dl)
۳/۹۷۷±۰۸۳a	۳/۹۵±۱۰۶a	۳/۹±۰۶a	۳/۹۷۷±۱۰a	۳/۹۸۷±۱۰۴a	(Albomin mg /dl)
۰/۹۱±۰/۰۷a	۰/۸۹±۰/۰۶a	۰/۸۸±۰/۰۳a	۰/۸۹±۰/۰۱a	۰/۹±۰a	(mg /dl) پیلی روپین

• میزان متغیرهای سرمی و بافتی کلیه مورد بررسی در گروه های مختلف

تجربی ۳	تجربی ۲	تجربی ۱	شاهد	کنترل	
۲۱/۷۰±۱/۰۲۰a	۲۱/۶۲۵±۸/۰۰a	۲۱/۱۲۵±۴۷۹a	۲۳/۲۴±۹/۰۲a	۲۴/۲۵±۹/۰۱a	BUN(mg /dl)
/۷۹۲±۰/۰۷a	/۸۸۰±۰/۰۹a	/۷۹۷۰±۰/۲۱a	/۸۷۲۰±۰/۴۶a	/۸۶۲۵±۰/۴۷a	Creatinin(mg /dl)
۵/۱۳۷±۶۷۸a	۷/۶۷۵±۱/۱۹۹a	۷/۹±۱/۱۵۵a	۵/۹۹±۰/۹۱۴a	۵/۹۸۷±۰/۹۱۱a	UA(mg /dl)
a۷۴۷/۳۷۷±۷۳/۸۴	۷۹۹/۱۲±۶۴/۸۹a	۱۰۰۷/۳۷۷±۲۵/۸۳b	۱۰۴۸/۱±۱۶/۰b	۱۰۴۱/۲۵±۱۶۸۰b	قطر کورتکس(میلی متر)
۱۸۳۶/۱۲±۱۳۵/۰۳a	۲۰۱۲/۱۲۵±۱۸۸/۰۳a	۲۱۶۹/۰۰±۱۲۹/۰۷a	۲۰۸۰/۰۰±۳۹/۰۰a	۲۰۸۳/۰۰±۳۹/۱۲a	قطر مدولا(میلی متر)
۳۳۹/۷۷±۹/۱۵a	۳۴۳/۷۵±۸/۸۱ab	۳۶۷/۸۳±۹/۶۲bc	۳۸۰/۴۲±۵/۰c	۳۸۴/۴۱±۵/۱۵c	قطر گلومرول(میلی متر)
۴۱۲/۷۷±۱۰/۶۹ab	۴۰۶/۴۲±۸/۵۸a	۴۳۸/۰۸±۱۴/۰bc	۴۵۰/۱۲±۱/۰C	۴۴۶/۷۴±۴/۰C	قطر کپسول بومن(میلی متر)
۷۳/۴۲±۵/۷۹a	۶۳/۵۸±۵/۰۵a	۷۱/۲۹±۸/۷۰a	۶۲/۲۰±۷/۷۰a	۶۲/۳۳±۷/۷۰a	قطر فضای ادراری(میلی متر)
۱۷۲/۶۷±۵/۷۷a	۱۶۳/۴۷±۶/۶۳a	۱۷۸/۵۴±۶/۵۹a	۱۸۲/۰۱±۶/۴۹a	۱۸۳/۴۱±۴/۵۶a	قطر لوله پروکسیمال(میلی متر)
۱۶۰/۷۲±۵/۰۲a	۱۶۳/۷۲±۵/۷۵a	۱۷۷/۴۱±۹/۵۶a	۱۸۱/۸۹±۸/۱۸a	۱۸۲/۲۰±۶/۱۴a	قطر لوله دیستال (میلی متر)
۱۲۲/۰۵±۶/۱۵a	۱۱۰/۶۶±۱/۴۵a	۱۲۱/۹۱±۵/۷۶a	۱۴۱/۹۰±۹/۲۰a	۱۴۲/۶۶±۵/۳۱a	قطر لوله منته(میلی متر)



شکل ۱: کاهش معنی دار قطر بخش قشری کلیه و قطر گلومرول بومن و قطر کپسول بومن در گروههای دریافت کننده دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم نسبت به گروه کنترل (هماتوکسیلین-أئوزین، بزرگنمایی ۴۰۰)



نمودار ۱: مقایسه گروههای مورد بررسی از نظر غلظت استروژن بعد از تأثیر عصاره تخمه کدو تبل در گلهای گروههای آزمایشی
اختلاف معنی داری با هم ندارند ($P > 0.05$)

در مصرف کنندگان غذای غنی سازی شده با تخمه کدو تبل می‌شود و لیکن در مطالعه‌ی حاضر گروه شاهد و گروهها دریافت کننده دوزهای ۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تغییر معنی داری از نظر وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان ندادند (۱۲).

نتایج مطالعه‌ی Hyounjeong (۱۴) و همکاران نشان داد که کدو تبل اثر کاهنده قوی چربی در یک رژیم غذایی افراد چاق مدل حیوانی دارد که عمدها به دلیل تأثیر آن بر سنتز و تخریب محصولات چربی در بدن است و همچنین آن را می‌توان به عنوان تنظیم کننده متابولیک از مسیرهای ساخت و تجزیه چربی-ها به حساب آورد (۱۴) و همچنین کدو تبل دارای خواص بالقوه کاهنده‌ی قند خون می‌باشد و در رژیم غذایی افراد دیابتی کاربرد دارد (۱). حضور اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسیداولئیک و اسیدلینولئیک دردانه کدو تبل، باعث کاهش سطح کلسترول در موش‌های صحرابی می‌شود (۱۵ و ۱۶). با توجه به اینکه کبد عضو بسیار مهم بدن در سوخت و ساز چربی می‌باشد، در مطالعه حاضر نیز که اثر تخمه کدو بر آنرژیم‌های کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت، میزان سرمی ALP در گروه تجربی ۳ نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد.

از کل فسفر موجود در بدن ۸۰ درصد آن در استخوانها موجود است و ۲۰ درصد آن در دیگر قسمتهای بدن وجود دارد. از آنجا که ۳۰ میلی‌گرم فسفر در هر کیلوگرم تخمه کدو وجود دارد و فسفر در ابتدای روده جذب می‌شود، این ماده سریعتر از کلسیم وارد خون شده و ذخایر بدن را تکمیل می‌کند. میزان متوسط فسفر در خون ۳ تا ۴ میلی‌گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر است. ویتامین D به جذب فسفر همانند کلسیم کمک می‌کند. لازم به ذکر است که مصرف بیش از اندازه فسفر موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود. زیرا این دو عنصر در ورود به سلولهای روده

نتایج مربوط به بررسی هورمون‌های جنسی ماده در موش‌های صحرابی ماده بالغ

نتایج حاصل از اندازه گیری هورمون FSH در گروه‌های مختلف بالغ نشان داد که گروه تجربی ۳ نسبت به گروه‌های تجربی ۱ و ۲ و کنترل افزایش معنی داری دارد. ولی در گروههای دیگر تغییر معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از اندازه گیری هورمون LH در گروه‌های مختلف بالغ نشان داد که گروه تجربی ۳ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد. ولی در گروههای دیگر تغییر معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از اندازه گیری هورمون استروژن در گروههای مختلف بالغ نشان داد که گروه تجربی ۳ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد. ولی در گروههای دیگر تغییر معنی داری مشاهده نشد. (نمودار ۱). نتایج حاصل از اندازه گیری هورمون پروژسترون در گروههای مختلف بالغ تغییر معنی داری را نشان نداد. با توجه به تحقیق حاضر می‌توان گفت که احتمالاً عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو دارای اثرات مثبت بر بافت تخدمان و همچنین محور هورمونی هیپوفیز گناد می‌باشد و باعث تغییرات معنی داری در سطح فولیکول‌های تخدمان و همچنین هورمون‌های جنسی ماده نیز می‌شود.

بحث

اثرهای جانبی داروهای شیمیایی، حساسیت افراد به برخی از این داروها و مقاوم شدن بسیاری از بیماری‌ها در برابر داروهای شیمیایی باعث می‌شود که باز دیگر نظر و توجه دانشمندان و محققان به استفاده از فرآورده‌های گیاهی در زمینه‌های مختلف معطوف گردد (۶). مطالعه Bataineh و همکاران نشان داد که مصرف تخمه کدو باعث افزایش قابل توجهی در میزان وزن بدن

بنابراین، دانه کدو تبل که حاوی β -sitosterol است می‌تواند به حفظ سلامت انسان کمک کند (۲۴). در مطالعه حاضر و بررسی های انجام شده تغییر معنی داری در سطح سرمی AST، ALT پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین، اسید اوریک، کراتینین نسبت به گروه کترول مشاهده نشد.

هرمون های استروژنی، اصلی ترین نقش را در تنظیم رشد، تکوین، هوئوستازی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده در تخدمان دارند. به طوری که در زمان یائسگی که همراه با قطع عملکرد تخدمانی و اتمام فولیکولهای تخدمانی است، تولید دوره ای استروژن قطع می‌شود (۲۵). مطالعاتی که توسط Raicht و همکاران و Awad و همکاران انجام شد نشان داد که تخمه کدو تبل حاوی فیتواستروژن می‌باشد که دارای بسیاری از اثرات زیستی از جمله، فعالیت استروژنیک و فعالیت ضد سرطانی است (۲۶-۲۷). فیتواستروژن‌ها دو گروه هستند: ۱- فلاونوئیدها-۲ غیر فلاونوئیدها. فیتو استروژن‌های مصرفی در غذای انسانی در گروه فلاونوئیدها قرار دارند و شامل ایزو فلاونونها هستند. ایزو فلاونونها استروژن‌های گیاهی هستند که مشابه هرمومن استروژن زنانه به گیرنده استروژنی سلول‌ها در ارگان‌های مختلف بدن انسان متصل می‌شوند (۲۸). با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه ای که توسط Gossell-Williams و همکاران انجام گرفت، تخمه کدو تبل سرشار از فیتو استروژن است که مصرف آن در زنان یائسه باعث کاهش علائم اصلی یائسگی مانند گرگرفتگی، درد مفاصل (به دلیل عدم وجود فعالیت پاراتورمونی استروژن) و سردرد می‌شود (۲۹). نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر در گروه موشهای بالغ دریافت کننده دوز حداقل افزایش معنی دار در میزان هرمومن استروژن نسبت به گروه کترول مشاهده گردید. با توجه به اینکه افزایش میزان LH سبب افزایش تولید آندروژن‌ها می‌شود (۳۰) و در تحقیق حاضر میزان LH در گروه تجربی ۳ (گروه حداقل) بالغ افزایش معنی دار نسبت به گروه کترول داشته است، افزایش میزان استروژن در این گروه قابل توجیه است. در مطالعه حاضر به علت تغییر بر میزان استروژن، احتمال تأثیر آن بر نتایج و مارکرهای مورد مطالعاتی کبد و کلیه وجود دارد که این مورد مطالعات بیشتر را در آینده می‌طلبد.

نتیجه گیری

عصاره تخمه کدو تبل توانسته است میزان سرمی ALP در گروه تجربی ۳ نسبت به گروه کترول را به طور معنی دار کاهش دهد و همچنین بر روی بافت کلیه گروه تجربی ۲ و ۳ باعث کاهش قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری شده است.

رقابت می‌کنند. میزان فسفر در خون، توسط هرمومنی به نام پاراتورمون کترول می‌شود. در صورتی که مصرف فسفر حیلی بیش از کلسیم باشد مثلاً فرد عادت به خوردن گوشت زیاد و لبنيات کم داشته باشد، حالتی در فرد بوجود می‌آید که به آن هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه گویند که موجب افزایش گردش املاح در استخوان شده و محتوی کلسیم استخوان را کاهش می‌دهد. بنابراین عوارض مصرف زیاد فسفر عبارتند از: کاهش تراکم استخوان، کاهش توده ای استخوانی، شکستگی استخوان و اختلال در رشد. اگر فسفر دریافتی بیش از حد نیاز باشد میزان اضافی آن از ادرار دفع می‌شود. مقدار نیاز بدن به فسفر روزانه ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم در روز است. بنابراین این احتمال وجود دارد که زیادی فسفر در کلیه رسبوکنده و باعث اختلال عملکرد کلیه شود (۱۷). با وجود اثر ضد التهابی تخمه کدو در مفاصل برخلاف داروهای سطح چربی های مضر (لیپید پراکسیدها) را در اتصالات مفاصل افزایش نمی‌دهد و در واقع از پیشرفت آرتربیت جلوگیری می‌کند. تخمه کدو، اگر به عنوان یک میان وعده خورده شود، یک منبع خوب روی و اسیدهای چرب غیر اشباع و فیتو استریولوها (β -sitosterol) است که می‌تواند از بیماری های مزمن جلوگیری کند (۱۸، ۱۹ و ۲۰) (۲۱).

همچنین با توجه به این نکته که در مصرف داروهای گیاهی نیز در این زمانه توسط افراد غیر آگاه، زیاده روی و افراط می‌شود، علاوه بر این چون تخم کدو دارای مصرف زیادی در جامعه است و همچنین قدره تخم کدو به عنوان درمان پروستات استفاده می‌شود (۱۷)، این احتمال وجود دارد که مصرف بالای داروهای گیاهی به نوبه خود خطرناک باشد و بر سایر بافت‌های بدن تاثیرگذار باشد. مطالعات انجام شده نشان داد که وجود پتانسیم در تخمه کدو تبل باعث کاهش وقوع سنگ مجاري ادراری اگزالت کلسیم می‌شود و همچنین تخمه کدو در کاهش خطر بیماری مثانه مؤثر است و همچنین تأثیر تخمه کدو در درمان علایم مجرای ادراری تحتانی و هیپرپلازی خوش خیم پروستات نیز گزارش شده است (۲۲ و ۹). مطالعات نشان داده اند که ۲۸ میلی گرم کلسیم، ۳۰ میلی گرم فسفر در یک گرم تخمه کدو وجود دارد و در مطالعه حاضر تأثیر عصاره تخمه کدو بر بافت کلیه را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که قطر کپسول بومن و گلومرول و بخش قشری کلیه در گروه تجربی ۲ و ۳ نسبت به گروه کترول کاهش معنی داری داشته است (۲ او ۳).

کدو تبل دارای مقدار قابل توجهی از آنتی اکسیدان‌ها، توکوفرول و کاروتونوئیدها است. بنابراین، کدو تبل به طور بالقوه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است که ممکن است برای پیشگیری از دیابت و بیماران با آسیب عروقی مفید باشد (۲۳).

β -Sitosterol کلستروول، فعالیت استروژنی و فعالیت ضد سرطانی است.

قدرتانی

از کلیه دست اندکارانی که در رسیدن به اهداف و نتایج این مقاله نقش داشته اند، تشکر و قدردانی می شود.

ملاحظات اخلاقی

رعایت ملاحظات اخلاقی از قبیل مطالعه بر روی نمونه حیوانی به جای نمونه انسانی، مراقبت و رعایت نظافت موشها در طول مطالعه و بیهوشی سریع و مرگ بدون درد موشهای صحرابی انجام گردید. لازم به ذکر است، مقاله مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جهرم با کد اخلاق REC.1393.071 می باشد.

منافع مقابل

اینجانب به عنوان نویسنده مسئول اظهار می دارد که منافع مقابلی از تالیف یا انتشار این مقاله ندارد.

مشارکت مؤلفان

س. م طراحی، اجرا و تحلیل نتایج مطالعه را بر عهده داشت. همچنین مقاله را تألیف نموده و نسخه نهایی را خوانده و تأیید کرده است.

References

- Asghari J, Mazaheritehrani M. Extraction of tannin from Eucalyptus camaldulensis Dehn and trimyristin from Myristica fragrans Houtt by using microwave irradiation. *Iranian J Medicinal and Aromatic Plants* 2010; **26**(2): 185-195. Persian.
- Pretre R, Robert J, Mirescu D. Pathophysiology, recognition and management of pneumoretroperitoneum. *J Surg* 1993; **80**: 1138-1140. doi: 10.1002/bjs.1800800923
- Ripetti V, Caricato M, Arullani A. Rectal perforation, retro pneumoperitoneum, and pneumomediastinum after stapling procedure for prolapsed hemorrhoids: report of a case and subsequent considerations. *J Dis Colon Rectum* 2002; **45**: 268-270. doi: 10.1007/s10350-004-6159-3
- Stevenson D G, Eller F J, Wang L. Oil and tocopherol content and composition of pumpkin seed oil in 12 cultivars. *J Agric Food Chem* 2007; **55**: 4005-4013. doi: 10.1021/jf0706979
- Murkovic M, Hillebrand A, Winkler H. Variability of vitamin E content in pumpkin seeds (*Cucurbita pepo* L.). *J Forsch* 1996; **202**: 275-278. doi: 10.1007/BF01206096
- Salimi M, Ebrahimi A, Shojaae Asadieh Z. Essential oil composition of *Kelussia odoratissima* Mozaff. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants* 2010; **26**(2): 156-147. Persian.
- Davazdah Emami S. The use of medicinal plants. Tehran, *Agricultural Research Center in Isfahan*, 2003; PP: 113. Persian.
- Kianmehr. Knowledge of medicinal plants. Tehran, Atiz pub. 2012; PP: 224. Persian.
- Farbin S, Davidson P, Shockley L. Perforation of the sigmoid colon by hydrostatic pressure of a public water fountain. *J Emerg Med* 1996; **14**: 703-706. doi: 10.1016/S0736-4679(96)00179-5
- Rad K. *Pharmacies at home*. Sixth edition. Tehran, bridge paplition, 2011; PP: 344 (Persian).
- Q khaoshbin. *Miracle plants*. Fourth edition. Tehran. 2013, PP: 480. (Persian).
- Marianna N, Tzortzis N, Elizabeth F. Antioxidant and lipoxygenase inhibitory activities of pumpkin seed extracts. *J Food Research International* 2009; **42**: 641-646. doi: 10.1016/j.foodres.2009.02.003
- Bataineh Z M, Hani I H, Al-Alami J R. Zinc in normal and pathological human prostate gland. *J Saudi Med* 2008; **23**(2): 218-220.
- Hyounjeong C, Haekwan E, Kyoungcheol P. A water-soluble extract from *Cucurbita moschata* shows ant obesity effects by controlling lipid metabolism in a high fat diet-induced obesity mouse model. *J BBRC* 2007; **359**: 419-425. doi: 10.1016/j.bbrc.2007.05.107
- Takada R, Saitoh M, Mori T. Dietary gamma linolenic acid-enriched oil reduces body fat content and induces liver enzyme activities relating to fatty acid beta oxidation in rats. *J Nutr* 1994; **124**: 469-474.
- Gerhard I I, Patek A, Monga B. Mastodyn (R) beiweiblicher Sterilitat. *J Forsch Komplementarmed* 1998; **5**: 272-278. doi: 10.1159/000021154
- <http://www.mahshar.com/nutrition/features/fosfor.htm>
- Sabudak T. Fatty acid composition of seed and leaf oils of pumpkin, walnut, almond, maize, sunflower and melon. *J Chem Nat Compd* 2007; **43**: 465-467. doi: 10.1007/s10600-007-0163-5
- Ryan E, Galvin K, O'Connor T P. Phytosterol, squalene, tocopherol content and fatty acid profile of selected seeds, grains, and legumes. *J Plant Foods Hum Nutr* 2007; **62**: 85-91. doi: 10.1007/s11130-007-0046-8
- Phillips K M, Ruggio D M, Ashraf-Khorassani M. Phytosterol composition of nuts and seeds commonly consumed in the United States. *J Agric Food Chem* 2005; **53**: 9436-9445. doi: 10.1021/jf051505h
- Kumar SA, Sudhahar V, Varalakshmi P. Protective role of eicosapentaenoate-lipoate (EPA-LA) derivative in combating oxidative hepatocellular injury in hypercholesterolemic thermogenesis. *J Atherosclerosis* 2006; **189**: 115-122. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2005.11.037

22. Dreikorn K. The role of phototherapy in treating lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia. *J World. Urol* 2002; **19**: 426-435. doi: 10.1007/s00345-002-0247-6
23. Yadav M, Jain S, Tomar R. Medicinal and biological potential of pumpkin: an updated review. *J Nutr Res Rev* 2010; **23**: 184-190. doi: 10.1017/S0954422410000107
24. Bradvord PG, Awad AB. Phytosterols as anticancer dietary components. *Molecular Nutr J* 2007; **151**(2): 161-170. doi: 10.1002/mnfr.200600164
25. Quirk P G, patchell V B, Colyer Y. Conformational Effect of serine phosphorylation in phospholamban peptides. *European J Biochemistry* 1996; **236**: 85-91. doi: 10.1111/j.1432-1033.1996.00085.x
26. Awad A B, Fink C S. Phytosterols as anticancer dietary components: evidence and mechanism of action. *J Nutr* 2003; **130**: 2127-2130.
27. Raicht R F, Cohen B I, Fazzini E P. Protective effect of plant sterols against chemically induced colon tumors in rats. *J Cancer Res* 2000; **40**: 403-405.
28. Kershaw D R. *Animal diversity*. 2010; 4th ed, London, Chapman and hall. PP: 418. doi: 10.1017/s002555720000677x
29. Gossell-Williams M, Hyde C, Hunter T. Improvement in HDL cholesterol in postmenopausal women supplemented with pumpkin seed oil: pilot study. *J Climacteric* 2011; **14**(5): 558-564.
30. Speroff L, Fritz M. Anovulation and the polycystic ovary. *Journal of Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility* 2012; **7**: 465-498.